

1. Hypon melolontha villosa. Fab. - le hanneton cotonneux. Diction. Encyclop. tom. 7. pag. 14. n° 8. - il se trouve fréquemment en Italie, dans les provinces méridionales de la France : il est quelque fois commun aux environs de Paris.
2. Scarabaeus solstitialis. Linn. - le petit hanneton d'automne (Scarabée). Geoffroy. tom. 1. pag. 74. n° 7. le hanneton solsticial. Diction. Encyclop. tom. 7. pag. 15. n° 12. - il se trouve dans toute l'Europe, pendant une grande partie de l'été, sur différents arbres, dont il rongé les feuilles.
3. Scarabaeus auratus. Linn. - l'émérandine (Scarabée). Geoffroy. tom. 1. pag. 73. n° 5. la cétaine dorée. Diction. Encyclop. n° 7. : elle se trouve dans toute l'Europe, sur les fleurs.
4. Scarabaeus nobilis. Linn. - le verdier (Scarabée). Geoffroy. tom. 1. pag. 73. n° 6. la cétaine noble. Diction. Encyclop. n° 90. : elle se trouve en Europe, sur les fleurs.
5. Scarabaeus histellus. Linn. - l'arlequin velu (Scarabée). Geoffroy. tom. 1. pag. 81. n° 17. la cétaine velue. Diction. Encyclop. n° 81. : elle se trouve dans presque toute l'Europe, sur les fleurs.
6. Scarabaeus sticticus. Linn. - le Drap mustuaire (Scarabée). Geoffroy. t. 1. p. 79. n° 14. - la cétaine stictique. Diction. Encyclop. n° 82. : on la trouve dans presque toute l'Europe, sur les fleurs, et surtout sur celle des chardons.
7. Scarabaeus fasciatus. la lièvre de vers (Scarabée). Geoffroy. tom. 1. pag. 80. n° 16. la cétaine fasciée. Diction. Encyclop. n° 92. : elle se trouve dans presque toute l'Europe, sur les fleurs.
8. Scarabaeus stercorarius. Linn. - le grand pillulaire (Scarabée). Geoffroy. tom. 1. pag. 75. n° 9. - le Scarabée stercoraire. Antomologie ulivière, pag. Scarabée, n° 3. Exp. 72.
9. Scarabaeus aethiops. <sup>Linn.</sup> - le petit Bousier noir cornu. Geoffroy. tom. 1. pag. 89. n° 3. le Bousier aethiops (mâle). Diction. Encyclop. n° 109. - il se trouve dans presque toute l'Europe.
10. Scarabaeus yaccardi. Linn. - le Bousier à 2 cornes. Geoffroy. tom. 1. p. 90. n° 5. le Bousier Yacche (mâle). Diction. Encyclop. n° 80. - il se trouve dans presque toute l'Europe, dans les boues, et les fientes.
11. Upatrum sabulosum. Syst. Nat. Gmelin. - le ténébrion à Stries dentelées. Geoffroy. tom. 1. p. 350. n° 7. - l'opatre sabuleux. Antom. ulivière, n° 56. Exp. 5. - il se trouve en France, souvent dans les charognes.
12. Carabus crepitans. Linn. - le Buprest à tête, corcelet et patte rouges, et écuir bleu. Geoffroy. t. 1. pag. 151. n° 19. - le carabe pétard. Diction. Encyclop. n° 82. - il se trouve dans toute l'Europe. - il a été observé que quand on prend cet insecte dans la main, ou quand on lui touche le ventre, il fait sortir avec éclat de son ventre une fumée bleue, formant un petit bruit, tel que celui d'un peu de poudre à canon à laquelle on met le feu, et il répète cette fumée avec un pareil bruit plus de 20 fois de suite, et aussi long-temps qu'on le touche : c'est ce qui lui a fait donner le nom de crepitans (pétard) par Linné.

13. Scarabæus firmetarius. Linn. - le Scarabé bédouan. Geoff. tom. 1. p. 81. 46. 18. - le Bousier finétaire; encyclop. Diction. 4. 6: il se trouve dans toute l'Europe, dans les bouses, et les fientes.
14. Scarabæus conspurcator. Linn. - le Scarabé gris des bouses. Geoff. t. 1. p. 82. 46. 19. - le Bousier sale. Dict. encyclop. 4. 11: - il se trouve dans toute l'Europe, dans les fientes.
15. Tenebrio lœvigatus. Linn. - la chrysonote à un seul élytre. Geoff. tom. 1. p. 265. 46. 19. - la chrysonote tenebriou. Dict. encyclop. 4. 1: elle se trouve par terre, dans les bois, les haies, les jardins.
16. Silpha atrata. Linn. - le Bouclier noir à 3 raies, et corcelet lisse; Geoff. tom. 1. p. 118. 46. 1. - le Bouclier aître; Dict. encyclop. 4. 12: il se trouve en Europe, dans les cadavres, et le plus fréquemment dans les champs.
17. Bruchus pisi. Linn. - le mylabre à croix blanche. Geoff. tom. 1. p. 267. 46. 1. - la Bruche du pois. Dict. encyclop. 4. 14: cet insecte se trouve en France, sur les fleurs. La larve vit dans l'intérieur des pois et autres graines, - légumineuses.
18. Chrysomela meridionalis. Linn. - le criocère rouge du Lys. Geoff. tom. 1. p. 239. 46. 1. - le criocère du Lys. Dict. encyclop. 4. 5. - les élytres de cet insecte prennent une couleur d'un jaune testacé, dans les collections: il se trouve dans toute l'Europe.
19. Cerambyx sanguineus. Linn. - la lépture veloutée couleur de feu. Geoff. tom. 1. p. 220. 46. 21. - le Callidie Sanguin. Dict. encyclop. 4. 30. - il se trouve en Europe, dans les bois, dans les chantiers, et surtout dans les maisons. Cet insecte est très commun à Nantes, au commencement du printemps.
20. Dermestes lardarius. Linn. - le Dermeste du lard. Geoff. tom. 1. p. 101. 46. 5. - le Dermeste du lard; Dict. encyclop. 4. 1. - Cet insecte se trouve dans toute l'Europe: sa larve attaque non-seulement le lard, mais toute les substances animales, en putréfaction ou desséchées.
21. Cicindela campestris. Linn. - le Velours Vert (Bupreste); Geoff. tom. 1. pag. 154. 46. 27. - la Cicindèle champêtre. Dict. encyclop. 4. 9: elle se trouve dans toute l'Europe, dans les endroits secs et sablonneux.
22. Carabus spinibarbis. Fab. - le Carabe spinibarbe. Dict. encyclop. 4. 87. - c'est un Bupreste de Geoffroy, que cet auteur n'a point décrit, quoique, suivant Olivier, il se trouve aux environs de Paris. celui-ci a été trouvé aux environs de Nantes.
23. Carabus agrestis. Oliv. - le Bupreste noir velouté; Geoff. tom. 1. p. 150. 46. 38. - le Carabe agreste. Dict. encyclop. 4. 105. il est commun en France, dans les champs.
24. Carabus marginatus. Linn. - le Bupreste Vert à bordure. Geoff. tom. 1. pag. 162. 46. 41. - le Carabe marginé. Dict. encyclop. 4. 117. - il se trouve en Europe, dans les champs.

25. Carabus purpurascens. fab. le Supreste arisé; Geoff. tom. 1. pag. 144. us. 1. - le Carabe purpurin. Dict. encyclop. tom. 5. p. 325. us. 12. - il se trouve en Europe, sous les pierres, et dans les ordures, des jardins. il n'est pas rare aux environs de Nantes.
26. Carabus vaporarium. fab. - le Carabe élucier; Dict. encyclop. tom. 5. pag. 352. us. 147. Cet insecte se trouve dans presque toute l'Europe; Geoffroy ne l'a pas décrit.
27. Carabus laticornis. Lin. le Supreste en deuil; Geoff. tom. 1. p. 160. us. 37. - le Carabe large; Dict. encyclop. us. 103. - il se trouve dans presque toute l'Europe.
28. Cimex personatus. Lin. la punaise mouche; Geoff. tom. 1. pag. 436. us. 4. pl. 9. fig. 3. - le Reduse peronné. Dict. encyclop. pl. 124. us. 29 Bis: cette punaise se trouve en Europe, et souvent dans les maisons.
29. Cimex lacustris. Lin. la punaise Hayado; Geoff. tom. 1. pag. 463. us. 59. la pentatome Hayado; Dict. encyclop. pl. 124. fig. 21. - cet insecte se trouve sur la surface des eaux tranquilles, des mares, et des Bassins.
30. <sup>Cicada</sup> Cimex sanguinea. Lin. la cigale à taches rouges; Geoff. tom. 1. pag. 418. us. 6. Stoll. cimic. 2. pl. 5. fig. 27. cette espèce se trouve en Europe, et est la plus belle de toutes celles que nous avons.
31. Cimex baccarum. Lin. la punaise brune à antennes et bords jaunâtres; Geoff. tom. 1. pag. 466. us. 64. elle se trouve en Europe, fréquemment sur les arbres, et souvent sur les groschiers.
32. Cimex rostratus. Gyllen. la punaise à bec; Geoff. tom. 1. p. 446. us. 35. elle se trouve fréquemment en France.
33. Urya cimicoides. Lin. - la Uryade; Geoff. tom. 1. p. 474. us. 1. - la Uryade cimicoïde. Dict. encyclop. pl. 122. fig. 1. 2. 3. 4. 5. - cet insecte se trouve en Europe, dans les eaux.
34. Notonecta glauca. Lin. - la grande punaise à ailerons; Geoff. t. 1. p. 476. us. 1. - Notonecte; Dict. encyclop. pl. 121. fig. 1. : elle se trouve en Europe, dans les eaux tranquilles, où on la voit nager sur le dos.
35. Curculio angustatus. fab. - le Charanson rétréci; Dict. encyclop. tom. 5. pag. 493. us. 92. cet insecte se trouve dans toute la France, en Angleterre, sur les chardons; on ne le voit point décrit dans l'ouvrage de Geoffroy.
36. Cerambyx fuliginator. Lin. le Capricorne usé au cendré; Geoff. tom. 1. pag. 205. us. 8. - la lamie fuligineuse; Dict. encyclop. us. 83. - cet insecte se trouve en France, et est très-commun aux environs de Paris. celui-ci a été trouvé à 4 lieues de Nantes.
37. Cerambyx cerdo. Lin. le petit Capricorne noir; Geoff. tom. 1. p. 204. us. 2. le Capricorne Sassetier; Dict. encyclop. us. 20. - cet insecte se trouve dans presque toute l'Europe.

38. *Cantharis bipustulata*. Lin. - la cicindele verte à points rouges; Geoff. tom. 1. p. 173  
 usq. 8. - le malachie bipustulé; Dict. encyclop. usq. 3. - cet insecte se trouve en  
 Europe, sur les fleurs.
39. *Chrysomela sanguinolenta*. Lin. - la chrysomèle noire à bordure rouge; Geoff.  
 tom. 1. pag. 254. usq. 8. - la chrysomèle sanguinolente; Dict. encyclop. usq. 73.  
 elle se trouve en Europe, dans les bois, dans les champs, sur les bords des  
 chemins.
40. *Chrysomela asparagi*. Lin. - le criocère porte-croix de l'asperge; Geoff. tom. 1. p. 241.  
 usq. 3. - le criocère de l'asperge; Dict. encyclop. usq. 26. - il se trouve dans toute l'Europe.
41. *Atelabus apiarius*. Lin. le clairon à bandes rouges; Geoff. tom. 1. p. 304. usq. 1. - le clairon  
 apivore. Dict. encyclop. usq. 17. - il se trouve dans toute l'Europe, sur les fleurs, surtout  
 sur dans les ruches des abeilles, et se nourrit de leur larves et de leurs excretes.
42. *Uniscus armadillo*. Lin. le cloporte armadille; Geoff. tom. 2. pag. 670. usq. 1. - le  
 cloporte armadille; Dict. encyclop. usq. 2. - il se trouve dans presque toute l'Europe,  
 sous les pierres, dans les endroits frais et humides. quand on le prend, il se roule  
 en boule.
43. *Hister quadrimaculatus*. Lin. l'escarbot quadrimaculé; Dict. encyclop. usq. 8.  
 cette espèce ne parait point avoir été décrite par Geoffroy: elle se trouve dans  
 presque toute l'Europe.
43. *Hister reniformis*. Olivier. l'escarbot reniforme; Dict. encyclop. usq. 9. cette espèce qui  
 diffère de la précédente par ses taches, ne parait point non plus avoir été décrite  
 par Geoffroy; on la trouve fréquemment aux environs de Nantes.
43. *Cimex ornatus*. Lin. la punaise rouge du chou; Geoff. tom. 1. p. 469. usq. 69. elle  
 se trouve en Europe, sur le chou, sur la plupart des plantes crucifères.
44. *Elater aterrimus*. Lin. - le taupin en deuil; Geoff. tom. 1. p. 136. usq. 13. - le taupin obscur  
 Latom. Olivier. Esp. 34. - il se trouve en Europe.
45. au 1er aspect, on seroit tenté de prendre cet individu pour un *Staphylin*; mais en y  
 faisant tant soit peu d'attention, il est facile de s'apercevoir qu'il diffère de *Staphylin*  
 tant par la forme de ses antennes, que par les appendices dont l'extrémité de son  
 abdomen est pourvue; de sorte que l'on est autorisé à croire que ce n'est point un  
*Staphylin*, mais bien plutôt la larve d'un autre insecte, et on soupçonne que ce  
 pourroit être celle d'une espèce de *Cantharide*. nous ne prononcerons rien  
 sur cette conjecture  
 tardive, sans plus de certitude, qu'un plus ample examen.
46. *Chrysomela bipunctata*. Lin. la melobente quadrite à corceles noires; Geoff. tom. 1. p. 195.  
 usq. 1. cet insecte se trouve en France sur le prunellier sauvage.
47. *Galeruca nigripes*. Olivier. la galeruque nigripède; Dict. encyclop. usq. 12. - cet insecte  
 se trouve ordinairement dans les départements méridionaux de la France; il n'a pas été  
 décrit par Geoffroy.
48. *Galeruca rustica*. Fab. la galeruque brunelle (Car.) Geoff. tom. 1. pag. 253. usq. 1. - la  
 galeruque rustique; Dict. encyclop. usq. 9. elle se trouve en France, en Allemagne.
49. *Chrysomela caprea*. Lin. la galeruque grinette. Geoff. tom. 1. p. 254. usq. 5. - la galeruque  
 du Saut-Coprier. Dict. encyclop. usq. 27. - elle se trouve en Europe, sur les Sauts.
50. *Cistela laphroïdes*. Fab. la cistèle laphroïde. Latom. Olivier. usq. 34. Esp. 3. pl. 1. fig. 3. a.  
 cette espèce a beaucoup de rapport avec la *Chrysomela coramboides* de Linne, ~~ou~~ la mordelle  
 à étuis jaunes de Geoffroy. tom. 1. pag. 354. usq. 3, et ne mériteroit qu'une variété.  
 Olivier observe qu'elle se trouve au midi de l'Europe.

51. Chrysomela asparagi. Lin. le crivore porte-croix de l'asperge; Geoff. tom. 1. p. 266.  
us. 3. - le crivore de l'asperge. Dict. Encyclop. us. 26. - il se trouve dans toute  
l'Europe. la larve se nourrit de feuilles de l'asperge officinale.

52. Curculio incanus. Lin. fab. le charanson gris, Stric. et sans ailes; Geoff. tom. 1.  
pag. 282. us. 10. - le charanson incane; Dict. Encyclop. us. 276.  
il se trouve dans presque toute l'Europe.

53. Asilus forcipatus. Lin. - l'asile cendré; Geoff. tom. 2. pag. 173. us. 16. - l'asile  
cendré. Dict. Encyclop. us. 23. - on le trouve dans toute l'Europe, dans le champs,  
et dans les bois.